

## 蜂窩性組織炎

### 一、何謂「蜂窩組織炎」？

皮膚上的傷口，包括：擦傷、切傷、抓傷、咬傷、燒傷、手術後傷口、皸裂，或是皮膚病所引的潰爛、糜爛、濕疹等，人體出現了以上所述的傷口，就成了致病細菌入侵人體的最佳路徑。當致病細菌進入皮膚組織之後，引起真皮、皮下組織或淋巴組織的炎症反應。

### 二、常見的症狀：

因為受感染部位的不同常出現不一樣的症狀與反應：

1. 局部的症狀：發炎部位皮膚呈現紅、腫、熱、痛，偶爾起水泡、淋巴腺腫大(淋巴管炎)。
2. 全身性症狀：倦怠、畏寒、發燒、頭痛、嘔吐、休克（敗血症）。
3. 臉部中央部位的蜂窩組織炎（包括鼻部、上唇）：可因臉部血管與腦部血管相通，而危及生命。
4. 眼睛周圍的蜂窩組織炎：常合併鼻竇炎、急性中耳炎及咽喉炎等。

### 三、好發族群：

1. 糖尿病患者：因局部血液循環差，若血糖控制不理想，傷口癒合不佳，就容易導致蜂窩組織炎，甚而局部筋膜炎、壞死甚至截肢。
2. 痛風患者：受高尿酸侵蝕的關節，易受到細菌感染。
3. 足癬(香港腳)傷口。
4. 下肢靜脈曲張。
5. 肝功能不佳，如：肝硬化。
6. 抵抗力差(免疫力差)，如：老年人、幼童或營養不良的人...等。

