

檢驗項目	Anti-Tg			版本 2018.10.04
中文名稱	甲狀腺球蛋白抗體			
英文名稱	Anti-Thyroglobulin			
適應症	輔助診斷自體免疫引起之甲狀腺疾病			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	< 4.11 IU/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 3 天；如未於 3 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12068B	點數	200 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光微粒免疫分析法 (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay ; CMIA) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：1 – 10,000 IU/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1 IU/mL ● 干擾：人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。 			