

檢驗項目	Anti-Beta2 Glycoprotein IgG			版本 2015.03.25
中文名稱	抗 B2 醣蛋白 IgG 抗體			
英文名稱	Anti-Beta2 Glycoprotein IgG			
適應症	根據抗磷脂症候群的實驗室標準： 1.病患血漿中出現 Lupus anticoagulant，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到陽性結果。 2.病患血清或血漿中出現 anti-cardiolipin IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。 3.在病患血清或血漿中出現 anti- β 2-GlycoproteinIAb IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12133B	點數	300 點

檢驗方法及說明	
---------	--