

檢驗項目	Anti-cardiolopin IgG			版本 2015.03.25
中文名稱	抗心脂抗體 IgG			
英文名稱	Anti cardiolipin IgG			
適應症	抗磷脂症候群(Antiphospholipid syndrome, APS)又稱為 Hughes syndrome，為一種全身性自體免疫疾病，可能造成動脈或靜脈的血栓、反覆性流產，經常會伴隨著輕度至中度的血小板低下症，且病患血清中會出現抗磷脂抗體(lupus anticoagulant, anti-cardiolipin 及/或 anti-β2-glycoprotein I 抗體)。 Anti-cardiolipin Ab 常見於紅斑性狼瘡 (SLE) 或藥物引起的狼瘡患者，其他慢性疾病（如惡性腫瘤）、梅毒、感染症及年紀大的人可能會出現偽陽性反應。Cardiolipin IgG 在若檢測結果為弱陽性結果，建議病患進行追蹤，並於 3 個月後再次進行檢測，若 3 個月維持一樣結果，請至風濕免疫科進行追蹤，確認是否有其他抗磷脂症候群相關症狀。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	30020B	點數	385 點

