

檢驗項目	Anti-CCP				版本 2015.03.25
中文名稱	抗環瓜氨酸抗體				
英文名稱	Anti-CCP				
適應症	類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）病患具有某種專一性的抗體，能夠與含有瓜氨酸(citrulline)的合成性胜肽反應。抗環瓜氨酸抗體(anti-cyclic citrullinated peptide antibody，anti-CCP)這個新的血清標記對類風濕性關節炎有很高的特異性(98%)能在臨床症狀出現之前早期偵測出類風濕性關節炎。 其他非類風濕性關節炎的自體免疫疾病或慢性感染疾病，Anti-CCP 抗體陽性率非常低，約 0.5%。如伴有關節侵蝕的系統性紅斑狼瘡(SLE)、HCV 相關的關節病變、反覆性風濕症(palindromic rheumatism，PR)、幼年型不明原因性關節炎(juvenile idiopathic arthritis，JIA)。儘管 Anti-CCP 抗體在 RA 中的致病機轉未完全闡明，但它對 RA 的早期診斷與鑒別、關節破壞的預測、以及評估預後有重要其臨床意義				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	14 工作日完成發報告				
參考範圍	<7 U/ml(-)，7-10 (±)，>10(+)				
採檢容器和檢體量	 5 mL，SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	12201B	點數	700 點	

