

檢驗項目	AFP			版本 2019.07.02
中文名稱	甲型胎兒蛋白			
英文名稱	α-fetoprotein			
適應症	1.用於原發性肝癌病人之診斷。 2.產前檢查用於輔助胎兒開放性神經管缺陷(NTD)之檢測			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	0-20 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天 ● 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12007C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 檢驗儀器/試劑：Roche e601 / AFP ● 方法： 化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：1 – 1,998,000 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1 ng/mL ● 干擾： 不可使用嚴重溶血的檢體。 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。			