檢驗項目	**Coomb's test indirect** 版本 2015.03.25
中文名稱	庫姆氏抗體(間接法)
英文名稱	Coomb's test indirect
適應症	偵測在體內血清中的抗體或補體，Rh（-）的孕婦第二次懷孕時，易產生抗體排斥造成新生兒溶血，診斷輸血反應所引起的溶血反應、自體免疫溶血性貧血、藥物引起之溶血性貧血。
檢體類別	血液
操作頻率	每天
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告
參考範圍	陰性(Negative)
採檢容器和檢體量	紫頭管 2ml 全血
採檢注意事項	● 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 ● 應儘快將紅血球與血漿分離，避免補體吸附到紅血球表面上影響結果

收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156

注意事項
● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。

健保代碼與給付點數	健保碼	12098B	點數	100 點

檢驗方法及說明