檢驗項目	**E2** 版本 2015.03.25			
中文名稱	雌二醇			
英文名稱	Estradiol			
適應症	評估卵巢的功能			
檢體類別	黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周二			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	男性： 11-44 pg/mL 女性： 濾泡期 21-251 pg/mL, 黃體期 21-312 pg/mL,停經後 ＜10-28 pg/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	**收檢地點**	**平日收檢時間**	**週六收檢時間**	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體離心後分立血清，置放於-20℃ 保存			
健保代碼與給付點數	**健保碼**	09127C	**點數**	180 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：10-10,000 pg/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：10 pg/mL ● 干擾 ： 1. 人類血清中的嗜異性抗體(Heterophilic antibodies)會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外免疫分析結果。 2. Ethynylestradiol > 0.8 ng/mL 3. Norethindrone > 32 ng/mL			