

檢驗項目	Fibrinogen			版本 2015.03.25
中文名稱	纖維蛋白原			
英文名稱	Fibrinogen			
適應症	Fibrinogen 第一因子於肝臟合成，經由 thrombin 作用後，轉變成 fibrin，作用是與血小板結合參與凝固作用。Fibrinogen 升高於組織傷害與急性感染發炎，類風濕性關節炎、肝炎。Fibrinogen 降低於流產、嚴重燒傷、後天溶血性貧血、凝固因子缺損、冷凝球蛋白血症、multiple myeloma、macroglobulinemia、DIC、羊水栓塞、白血病、淋巴瘤、血小板減少性紫癜。			
檢體類別	藍頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每周一次			
操作時效	7 工作天完成發報告			
參考範圍	200-400 mg/dl			
採檢容器和檢體量	 藍頭管(3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml			
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免溶血。 2. 一定要採血 1.8 ml，否則會影響檢驗結果。 3. 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 4. 應避免由 Heparin Flush 過的靜脈導管(或留滯針)中採取檢體，因其可能造成檢體被 Heparin 污染或稀釋。 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	08024B	點數	275 點
檢驗方法及說明				

