

檢驗項目	lupus anticoagulant test			版本 2015.03.25
中文名稱	狼瘡抗凝血因子			
英文名稱	lupus anticoagulant test			
適應症	Lupus anticoagulant(LA)屬 Anti-phospholipid 抗體的一種。陽性可能出現典型的 APS 症狀，包括血栓形成、中風、血管梗塞、血小板減少、孕婦慣性流產等。 Lupus anticoagulant 會使 APTT 凝固時間延長， 5 ~ 10% 的紅斑性狼瘡 (SLE) 患者會出現 LA (+)，藥物引起的狼瘡或某些藥物本身也會誘發 LA (+)。LA 經常伴隨 ANA、 Anti-cardiolipin 同時出現陽性，並常和 VDRL/RPR 偽陽性的抗體同時出現。臨床上不能僅以 LA 一項來診斷 APS 症狀，應該再參考其他 Anti-phospholipid 類抗體做綜合的診斷。			
檢體類別	藍頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 藍頭管(3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	08126B	點數	700
檢驗方法及說明				