

檢驗項目	LH			版本 2015.03.25
中文名稱	黃體激素			
英文名稱	Luteinizing hormone			
適應症	預測排卵期、不孕症之評估、以及腦下垂體和生殖腺疾病之診斷			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周二			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	男性： 0.57-12.07 mIU/mL 女性： 濾泡期 1.80 - 11.78 mIU/mL 月經中期高峰 7.59 - 89.08 mIU/mL 黃體期 0.56 - 14.00 mIU/mL 停經後 5.16 - 61.99 mIU/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09126C	點數	180 點
檢驗方法及說明	- 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.5 – 1,000 mIU/mL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.50 mIU/mL - 干擾： - 不可使用嚴重溶血的檢體。 - 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。			