檢驗項目	Methotrexate			版本 2015.03.25
中文名稱	滅殺除癌			
英文名稱	Methotrexate (MTX)			
適應症	用於監測使用滅殺除癌治療之患者體內的藥物濃度，避免過量產生危害，以確使病患得到適當的治療。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	Depends on regimens			
		用藥後	稀釋倍數	報告範圍(μmol/L)
		4-6 小時(Peak, T _{max})	1000x	90.0 ~ 1000
		24 小時	100x	9.0 ~ 100
		48 小時	10x	0.9 ~ 10
	72 小時	1x	0.02 ~ 1	
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 醫囑開立時，醫師需輸入用藥資訊。 2. 採檢時，需註明抽血人員姓名與實際抽血日期時間。 3. Methotrexate 檢體應避光保存，Methotrexate 的採檢時間應視藥物劑量、輸注時間及病患之臨床狀況而定。 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：若測試將延後 24 小時以上進行，應去除檢體中之凝塊、血清分離物或紅血球。檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	10504B	點數	320 點

檢驗方法及說明

- 方法：螢光偏極免疫分析法 (Fluorescence Polarization Immunoassay, FPIA)
- 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.02 - 1,000 $\mu\text{mol/L}$
- 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.02 $\mu\text{mol/L}$
- 干擾：
 1. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外免疫分析結果。
 2. 已接受鼠單株抗體進行診斷或治療之病患檢體可能含人類抗鼠抗 (HAMA)，含 HAMA 之檢體以利用鼠單株抗體之檢驗試劑測試可能產生異常的數值。
 3. 來自接受以 carboxypeptidase G2 為高劑量 methotrexate 急救治療之病患樣本不可以 TDx/TDxFLx Methotrexate II 分析測試，這些樣本含高血清濃度之 4- [2,4-diamino-6-(pteridinyl)methyl]-methylamino]-benzoic acid(DAMPA)，其可與此分析使用之 methotrexate 抗體交叉反應。