

檢驗項目	Procainamide&NAPA			版本 2015.03.25
中文名稱	普卡因胺			
英文名稱	Procainamide&NAPA			
適應症	Procainamide 為一種治療「心律不整」的藥物。其藥理作用與 quinidine 類似，主要是阻斷鈉離子快速的流入細胞內，而減緩動作電位快速上升，降低心肌之刺激及收縮的速度進而抑制心肌之收縮。Procainamide 阻斷週邊神經節而造成全身性血壓降低，它也具有較弱抗膽鹼作用，在體內會經由肝臟乙醯化代謝成 N-acetylprocainamide (NAPA)，此代謝產物會阻斷鉀離子之傳導而延緩再極化作用以達到抗心律不整之效果。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	10505B	點數	320 點
檢驗方法及說明				