| 檢驗項目 | Stool culture 版本 2015.03.25 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 糞便培養 | | | |
| 英文名稱 | Stool culture | | | |
| 適應症 | 適用於懷疑急性傳染性腹瀉之培養及鑑定，提供臨床診斷和使用抗生素的參考 | | | |
| 檢體類別 | 糞便 (Stool) | | | |
| 操作頻率 | 每天(北榮代檢) | | | |
| 操作時效 | 7 天；陽性反應待鑑定後發報告；陰性反應 7 天發陰性報告 | | | |
| 參考範圍 | 陰性 (No growth) | | | |
| 採檢容器和檢體量 | 以棉籤拭子取豌豆大小含有黏液、膿、血、或組織碎片部分的糞便。 | | | |
| 採檢注意事項 | 1. 不可用衛生紙收集糞便檢體。<br>2. 若無法取得糞便檢體的病人可使用直腸拭子(Rectal swabs)送檢，將拭子放入肛門括約肌約 1 吋的位置，小心旋轉拭子以取得肛門檢體，然後將拭子取出傳送。<br>3. 住院超過 3 天且收住院的診斷不是腸胃炎病人不要送常規性的 stool culture；應考慮 *Clostridium difficile* culture(導致偽膜性腸炎)。<br>● 飲食限制：無<br>● 用藥限制：無 | | | |
| 收檢時間與地點 | **收檢地點** | **平日收檢時間** | **週六收檢時間** | |
| | 本院 2 樓檢驗科 | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00 | |
| | 備註：例假日、天災停止門診時不收件 | | 連絡電話：02-2858-7000#7156 | |
| 注意事項 | 保存方法：4℃，不超過 24 小時<br>運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室 | | | |
| 健保代碼與給付點數 | **健保碼** | 13007C / 13008B | **點數** | 200 / 100 點 |
| 檢驗方法及說明 | 方法：嗜氧、厭氧專用培養基 / VITEK MS 鑑定系統<br>干擾因素：無 | | | |