

安寧緩和照護的末期病人

若無法由口進食，是否需要給予靜脈點滴注射？

- * 當您或家人已為疾病末期並接受安寧緩和照護，若本身過於虛弱或吞嚥功能障礙、無法自行進食時，您或家人需要考慮是否使用靜脈點滴注射以做為維持水分供應的目標.....
- * 我們希望幫助您瞭解有哪些治療的選擇，了解自己的需求及在意的東西，幫助您思考適合自己的選擇。

適用對象與狀況


疾病末期接受安寧緩和照護，因吞嚥功能障礙或腸胃道症狀如噁心、嘔吐、腹脹，無法經由腸道進食的患者。

醫療選項介紹



打點滴補充水分

您目前比較想



不打點滴補充水分



靜脈點滴介紹

給予病患靜脈注射生理食鹽水、葡萄糖水之類的輸液。



不給靜脈點滴的話....

- ◆ 若情況允許，鼓勵病人由口進食，但不勉強—我們稱為舒適餵食。
- ◆ 舒適餵食可以讓晚期病人繼續享受食物帶來的快樂。

是否使用靜脈點滴注射對病患的



打點滴

生活品質
續命時間
衍生的副作用



不打點滴



並無統計上明顯的差異

打不打點滴的優缺點分析~~

選項考量	打點滴	不打點滴
優點	避免病人脫水	可減少肺水腫、全身水腫、喘之類的問題
缺點	可能會肺水腫造成喘	可能會脫水

- **脫水**
可能會造成疲憊、意識不清、脈搏快、小便少、心腎功能受損
- **肺水腫**
可能會出現咳嗽、胸悶、呼吸困難、缺氧等情況
- **全身水腫**
多餘的水分無法排出體外而跑到身體的各部位

♥ 您在意的項目與在意程度為何？

傾向打點滴	比較接近	一樣	比較接近	傾向不打點滴					
我希望盡可能避免脫水	<	<	<	<	>	>	>	>	我知道有可能會脫水，但也知道無論是否給予點滴注射，續命時間並無太大差別。
我知道給予靜脈注射可能增加全身水腫與肺水腫的風險，但願意接受，	<	<	<	<	>	>	>	>	我希望盡可能避免全身水腫與肺水腫的風險
身為家屬，我非常擔心病人無法進食與缺乏水份供應的問題。	<	<	<	<	>	>	>	>	身為家屬，我知道是否給予靜脈點滴注射並不會影響病人的生命預後。希望盡可能以病人舒適度為主


考考您~~~ 是否瞭解了我們的說明？

- 給靜脈點滴注射可讓病人生存期延長。 對 不對 不確定
- 不給靜脈點滴注射，病人可減少水腫的危險性。 對 不對 不確定
- 給靜脈點滴可以改善病人的生活品質。 對 不對 不確定

我已經確認好想要的治療方式，我決定選擇：

給予靜脈點滴注射

不給靜脈點滴注射



我目前還無法決定

- 我想要再與我的主治醫師討論我的決定。
- 我想要再與其他人 (包含配偶、家人、朋友等...討論我的決定。)
- 對於以上治療方式，我想要再瞭解更多.....

我的問題有：

表單說明者：