

救心靈丹-硝化甘油片(NTG)

一、藥物作用

(NTG) 不是止痛劑，是血管擴張劑，可使冠狀動脈擴張，增加心肌供氧量，恢復心臟的正常功能。

二、服藥的方法

當胸悶或胸痛的時候，應立即服用，將藥片含於「舌下」約 30 秒鐘藥片溶解會由舌下血管吸收，服藥後約 3~5 分鐘可緩解胸悶胸痛，若未緩解可再服第二片，隔 5 分鐘後未緩解可再服第三片，如需服用第二顆時即應打 119 或到醫院求診。

三、用藥注意事項

- 1.無論何時何地應隨身攜帶藥片。
- 2.服藥時應採「坐姿」，服藥後要休息「10~15 分鐘」，因服藥後可能產生頭痛、頭暈、或姿位性低血壓，這是正常的反應(約 10 分鐘可恢復)。
- 3.唾液會幫助藥物的吸收，當含於舌下的藥片溶解時會有輕微口腔刺痛、燒灼、麻辣感。
- 4.如果您預知某些情況會導致心絞痛發作，也可以預先服用硝化甘油片。

四、如何儲放藥片及判斷藥物是否失效:

- 1.此藥具有揮發性，應避免暴露於空氣中，需將藥片裝於不透光、有蓋緊密的玻璃瓶內，可放在一般的室溫中，但需遠離光線、熱與潮濕處。
- 2.藥物保存期間：約 3~6 個月(指打開瓶蓋以後)。最好將打開瓶蓋的日期標示在瓶子上，以免藥物過期而不知，並注意藥品有無受潮。
- 3.服藥時若無「麻、辣感」，即表示此藥已失效。

