


糖尿病「藥物治療」注意事項

- 一、目前並沒有完全可以治好糖尿病的特效藥。
- 二、糖尿病的控制有賴於飲食、運動、藥物三者間相互配合。
 1. 如果飲食控制及適當的運動，仍無法控制血糖，請依照醫師處方按時用藥、不可隨意調整藥物劑量。
 2. 依照醫師指示接受血糖...等檢查，以作為藥物調整依據。
 3. 規則藥物治療、定時定量的進餐習慣、以預防低血糖。
 4. 如果肝腎功能不好、懷孕期間、第一型糖尿病患或口服降血糖藥不足以控制血糖，應配合醫師指示接受「胰島素注射」。
 5. 有些人擔心吃太多藥或長期用藥會傷害身體，而自行減少藥量或停藥，導致血糖期偏高，這種情況比藥物副作用對身體的傷害可能更嚴重。
 6. 糖尿病是一種慢性病，經過藥物治療後血糖會下降，但不表示糖尿病已經好了，反而是血糖得到控制。
 7. 了解用藥的種類，作用及副作用(熟悉藥物注意事項)，對於藥物使用有任何疑問，請洽詢醫療人員。

常用之口服降血糖藥

藥 名	服藥時間	作用	副作用
佑爾康(Semi)Euglucon 血糖平 Diabitin 岱蜜克龍 Diamicron 泌樂得 Glidiab 減糖尿 Minidiab 瑪爾胰 Amaryl	餐前 30 分鐘	刺激胰臟 分泌胰島素	皮疹或皮膚癢. 低血糖 水腫. 肝炎.
諾和龍 Novonorm			—



庫魯化 Glucophage	餐後 30 分鐘	抑制醣類 在腸道吸收	噁心、腹脹、腹瀉 舌頭有金屬味、疲倦、嗜睡、肌肉酸痛、換氣過度.
醣祿 Glucobay			腹痛、腹脹.
梵帝雅 Avandia	餐-前-後 皆可	降低胰島素 阻抗性	肝功能下降.
佳糖維 Januvia / Janumet(複方) 糖漸平 Trajenta/ Trajenta Duo(複方) 昂格沙 Onglyza	餐-前-後 皆可	增加胰島素 的分泌，並降 低升糖素的 分泌	噁心嘔吐、 腹瀉與頭暈
恩排糖 Jardiance/ 糖順平 Glyxambi(複方)	餐-前-後 皆可	降低腎臟吸 收葡萄糖，促 進糖份經由 尿液排出體 外	泌尿道感染、 胰臟炎

