

## 話說檢驗

### 生化檢驗禁忌

文/王家仁（本院檢驗科總醫檢師）

#### 問：為何要空腹禁食？

答：檢驗項目會隨著食物的攝取而有所波動，而造成暫時性增加或減少，影響結果判讀。為了幫助醫師診斷，使您獲得更好的醫療品質，敬請配合。

#### 問：空腹時應注意哪些事項？

答：一般來說空腹時間10小時～12小時，乃指檢驗時間往前推10小時～12小時開始禁食。空腹期間請勿進食（但可正常喝水），請勿喝含糖或酒精飲料。檢驗完即可開始進食。

#### 問：空腹抽血要禁食多少時間？

答：對於醫師囑咐「禁食」後方可抽血之檢驗項目，病人須在空腹6小時～8小時後抽血。

#### 問：抽血之後須注意事項是什麼？

答：抽血完畢後，病人須以手指緊壓抽血位置上之棉球10分鐘，不可以搓揉，以免造成血腫淤青現象。

#### 問：抽血後如有腫脹現象如何處理？

答：如抽血部位發生血腫或淤青現象，大部分原因是由於壓迫時間不夠或壓迫位置不對所致。第一天先稍作冰敷消腫，24小時以後再作熱敷。

#### 問：一般尿液如何採集？

答：用紙杯接取中段尿液（前段尿液不要用紙杯接），之後將紙杯尿液倒入尿液收集管內約八分滿(10cc)。

#### 問：尿液採集應注意哪些事項？

答：1. 飯後一小時內應避免作尿液採檢。2. 婦女正值月經週期間，原則上應避免作尿液檢查。3. 以上尿液在取檢後，請在一小時內送達檢驗科。4. 若尿液檢體無法即時送至檢驗科時，請把尿液放於4°C冰箱保存。

\*若有任何疑問請電洽：(02) 2858-7156檢驗科

## 寶貝老人

### 105年度「臺北市」老人免費健康檢查開跑

105年度登記方式有「現場登記」、「電話登記」及「網路登記」3種詳細公告請參看衛生局網頁<http://www.health.gov.tw/Default.aspx?tabid=401&mid=3146&itemid=32320>

• 預約時間：105年3月1日起

• 檢查時間：105年3月4日至105年8月31日（額滿截止；總計1200名額）

1. 設籍「台北市」且：(1)當年度年滿65歲以上之長者。

(2)或當年度年滿55歲以上之原住民。

2. 檢查地點：3樓健檢中心

3. 報到時間：上午8時至10時止，3樓健檢中心櫃檯。

4. 老人健檢現場預約登記作業流程

5. 費用：免費

6. 注意事項：

(1) **檢查當日請務必攜帶：身份證、健保IC卡。** (2) 早餐禁食（檢查前一天晚上12點後禁食）；檢查當天本院提供餐點。(3) 檢查前5日請勿食用動物內臟或含高鐵質（豬肝、雞肝…）之食物。(4) 請穿著二截式輕便寬鬆衣服，以便施行檢查。(5) 行動不便者，本院備有輪椅供您使用，請向一樓服務檯詢問。(6) **正式檢查報告於檢查三週後自取，由專任醫師解釋。**

7. 檢查項目：A組、B組擇其一組做檢查（預約時請告知欲做之組別，**檢查當天恕無法更動**）；**104年已作B組者，今年只可選擇A組。**

8. 合配國健局癌症篩檢：65-75歲長者（40-30年次），糞便潛血免疫定量分析每二年檢查一次。

#### A組

成人健檢項目

健康史、身體評估

◎子宮頸抹片檢查（限女性）

糞便潛血免疫定量分析

憂鬱症篩檢及認知功能評估

尿液常規檢查

血液常規檢查

生化檢查

簡式健康表

失智症篩檢量表(AD-8)

胸部X光檢查

心電圖檢查

α-胎兒蛋白

甲狀腺刺激素放射免疫分析(TSH)

#### B組

成人健檢項目

健康史、身體評估

◎子宮頸抹片檢查（限女性）

糞便潛血免疫分析

憂鬱症篩檢及認知功能評估

尿液常規檢查

血液常規檢查

生化檢查

簡式健康表

失智症篩檢量表(AD-8)

上腹部超音波檢查

諮詢專線：2858-7107或2858-7000#1180

## 醫眼透視

### 醫生的第三隻眼~超音波檢查

文/劉俊池（本院放射線科總放射線師）

超音波儀器在醫療上是一個應用非常廣泛的檢查工具，它的好處是方便、快速又不具侵

害性。是診斷疾病甚至於治療疾病的一個好幫手。在醫院，處處都可見超音波的應用，可愛的超音波幫我們穿越皮膚、脂肪、肌肉、骨骼，讓醫師的視野往身體內部延伸，進一步幫助我們找出身體的不適之處，才能作最有證據的診斷與治療。

#### 超音波以診斷檢查為主的功能

超音波檢查主要提供以診斷檢查為主的功能，應用廣泛幾乎涵蓋從頭到腳，例如檢查頸動靜脈及腦部血管，藉以評估血管阻塞硬化程度；頸部可檢查甲狀腺疾病、淋巴系統異常、頸部腫瘤；乳房超音波可以檢查纖維囊腫、腺瘤腫瘤、腋下淋巴結異常現象；心臟超音波可以判定心臟瓣膜或結構異常問題；胸部超音波可以看出肺部是否有積水現象；腹部超音波可以檢查肝、膽、胰、脾、腎器官；婦科超音波可以檢查骨盆腔內子宮、卵巢等器官的異常狀況。產科超音波可以檢查從胚胎囊到胎兒成長發育程度，藉以評估寶寶健康狀態；男性攝護腺超音波可以看到攝護腺肥大或腫瘤組織；超音波也可以評估組織積水、血塊等病灶；藉由超音波導引也可以運用在靜脈留置針埋設及組織病灶穿刺、引流、抽吸運用上。達到簡單迅速又正確的定位與積極性組織取樣作業

#### 超音波運用在治療上的功能

超音波運用在治療上可以利用在軟組織深層部位發炎：利用超音波深層導入，促使患部血液循環加速，促進代謝達到加速修復的作用，這種技術已經廣泛應用在復健醫學上。而在醫學美容上也可以利用超音波促使深層細胞增加通透性，讓美白除皺達到更深層的效果，也使美容產品藉由超音波導入達到更好的效果。

#### 超音波應用於母胎例行產檢

它是一種非侵襲性檢查，由於音波能量低，對人體沒有傷害，而且完全沒有游離輻射，如果短期內重複使用也沒有健康傷害的問題，因此也應用於孕婦及胎兒的例行產檢上，足以證明它是一項值得信賴也安全性相當高的檢查。

近代醫學中超音波檢查扮演著極為重要的角色，而且其重要性及適用範圍也隨著科技的進步而更加廣泛與精準。因此，有人稱超音波為醫生的第三隻眼睛其實再貼切不過了。

## 護理手記

### 過客終有美好的歸程 ~對護理之家老奶奶永遠的懷念

作者/白青潤（護理之家護理師）

黑暗中，生命的火花在瞬間燭爛後，稍縱即逝，比起殞落的流星和消失的火焰，還要來得絢爛而短暫。

職場生活中，每位住民都是護理之家的過客，但在這個月我送走了多年唯一會叫錯我職稱的奶奶。

奶奶入住彷彿還是昨天的事，記憶仍鮮明。她在家人陪同下完成入住手續，交班事項和其他住民一樣尋常，但在生活細節上卻非同小可。媳婦說：「奶奶日常生活就是早上念經之後吃飯睡覺。」所謂早起其實是凌晨3點，而且奶奶按紅燈鈴後就得使命必達。奶奶是虔誠佛教徒，我們安排佛學社師父進行床邊訪視關懷。隨著時光的流逝，奶奶對宗教關懷、團體活動及復健參與度與日俱減，團隊發現奶奶渴望的是「回家」。與家屬討論溝通後，明白返家計畫不可行，之後奶奶在家人探望時，笑容明顯地減少了。每當隔床住民回家過節時，奶奶表情總是很落寞，紅燈鈴響常劃破寧靜的夜晚，探視時，總會說：「沒事！」或「不是我按的。」過了幾年，奶奶出現失智情況，某天凌晨我值班，奶奶說：「師父要來和我說佛法」、「家人要帶我回家了」，而且態度異常堅持。經多次與家屬溝通後，奶奶終於首次告假回家一天，此後奶奶心情好轉，參加活動會開心地笑，也幫我升官加爵，封我為「白護理長」。

直到去年10月奶奶開始用拒食表達她不能回家的無奈。多次與家屬商討後，團隊決定陪她回家，原本悶悶不樂的奶奶，此時突然認真地讀起經書，也稍有胃口了。返家當天，親友紛紛前來探視，奶奶和家人一起包水餃，家人烤了刻有「生日快樂」的餅乾。她慶祝91歲生日。當天回護理之家後，奶奶似乎耗盡體力，此後幾乎每日臥床，飲食和水分極為少量。直到那晚我值班，送走了睡夢中的她，她很安祥、很幸福，團隊達成她的願望。

《金剛經》有段話：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」是指人生就像夢幻般不真實，像水中的泡泡、清晨的露珠、天空的閃電，下一刻就消失了。這個世界有無數個不同的「片刻」，而不是不變的永恆，我們應該從這個角度去認識，就會對世界有不同的體悟和想法，才能真正的看破，看破之後，還要放下，如果放下，執著這個，執著那個，便得不到自在，無論順境或是逆境，把它放下，毫不執著，才能得到自在。

現在我閉上眼，彷彿看到奶奶在微笑，我們在她生命的最後一刻陪伴她走完最後一程，回望一路上我們的交集有喜有悲，幸好與家屬在最後一刻讓奶奶完成心願，我想：還有什麼好放不下的呢？

讓美好的回憶留在心，隨著時間變得更美麗；將悲傷的回憶放下，隨著時間的流逝而忘去…

國內郵資已付  
北投郵局  
許可證  
北投兌字第86號

臺北市立關渡醫院  
Taipei Municipal Gan-Dou Hospital  
一臺北榮總經營一  
第188期  
2016年3月1日

宗旨  
配合國家政策，提供社區最優質的醫療服務  
願景  
成為社區醫療最佳醫院  
目標  
1. 提供以病人為中心之優質營養及全人照護  
2. 垂直整合發展急重症後期照護  
3. 發展安寧及社區居家醫療整合照護  
4. 促進病人、員工及社區之健康關懷服務

發行人/黃病勳 ■總編輯/陳昌明 ■編輯委員/張益德、高念慈、高麗雀、蔡文惠、高美華、蔣曉文 ■執行編輯/黃蓉美  
發行單位/臺北市立關渡醫院 ■地址/臺北市北投區關渡里知行路225巷12號 ■總機/(02)2858-7000 ■傳真電話/(02)2858-7197 ■設計印刷/順耀印刷廣告事業有限公司・(02)8964-2727

## 醫師開講

### 甲狀腺結節腫

文/袁維新（本院放射線科主任）

#### 什麼是甲狀腺結節腫？

健康檢查或門診時，有高達50%以上成年人被檢查出甲狀腺結節腫。有單一或多發性結節。約93%都是良性的，只小於7%的患者最後被確認是甲狀腺癌，因此建議觀察或門診追蹤即可。

#### 甲狀腺結節腫的主要原因

- **缺碘：**台灣自民國47年起在食鹽加碘後，國人缺碘情形已降低很多。
- **水質：**水質中的致腫物，特別是腐植酸，可能與甲狀腺結節腫有密切關係。
- **甲狀腺發炎：**自體免疫有關的慢性發炎最常見的，如橋本氏甲狀腺炎，通常表現出兩側甲狀腺腫大。亞急性甲狀腺炎與感染濾過性病毒有關，單側結節性腫大較常見，急性化膿性甲狀腺炎與感染細菌有關，呈現單側甲狀腺腫。
- **甲狀腺腫瘤：**良性的甲狀腺腫瘤以濾泡腺瘤最多，惡性腫瘤則以乳突癌最多，另外其他器官的腫瘤也可能轉移至甲狀腺。

#### 身體檢查發現

當甲狀腺理學檢查有異常結節時，如果有下列因素存在時，須注意有甲狀腺癌之可能。

- **甲狀腺本身或結節摸起來很硬。**
- **年齡：**愈年輕的病人愈易得癌症。
- **男性：**男性的甲狀腺結節可觸摸到時，惡性的機會是女性的二倍。
- **注意單發性甲狀腺結節：**多發性的甲狀腺結節通常是良性的。
- **短時間甲狀腺大得太快。**
- **在兒童期，胸、頸、頭部有放射線治療的病史，比如罹患淋巴癌或因胸腺、扁桃腺過大照過X光線。**

#### 甲狀腺生化檢查與核醫檢查


所有甲狀腺結節的病人，都要測血中的TSH（甲狀腺促進素）濃度，如果血中TSH濃度降低，表示可能是具分泌功能的單一或多結節的甲狀腺腫。因為具有分泌功能性的結節很少是癌症；相反地，若TSH上升，表示甲狀腺機能過低，雖然不能排除甲狀腺癌的可能，但因為癌症的機會很少，也可能是橋本氏甲狀腺炎。另外，血液中甲狀腺荷爾蒙如T3、T4、Free T4也可以做一些診斷上的幫忙。若核醫同位素碘-131攝取與甲狀腺掃描為冷結節時就要小心是否為甲狀腺癌，熱結節是代表有功能的或甲狀腺功能過高的，所以熱結節通常為良性。

#### 甲狀腺結節診斷工具

- **甲狀腺超音波掃描：**是一個沒有輻射線且敏感度高的檢查，它很方便而且花費不多，可正確測出甲狀腺結節中一些特性。
- **甲狀腺超音波導引細針抽吸細胞學檢查：**不管是囊性或實質性的，若發現甲狀腺結節在超音波下表現出惡性特徵，細針抽取細胞學檢查是目前區分甲狀腺良惡性的最有效方法。

#### 及早發現治療較佳

及早發現，即早配合醫師診斷與治療，甲狀腺疾病方能達到最佳療效。



## 門診新訊

### 本院新開辦女性整合門診

本院將於每週三下午門診時段開設「女性整合門診」，以婦產科為主，結合身心科、整形外科、中醫科為輔，提供婦女常見的疾病診療，一次掛號就可以解決婦女健康疾病問題，減少看診、候診與檢查的等候時間，也能妥善照顧女性病人的相關醫療問題與提供整合性的醫療照護，藉由橫向的溝通與整合，使各專科能充分發揮所長，進而達到婦女全方位照顧的目標。

~3月8日是婦女節，關渡醫院祝福所有的婦女朋友健康快樂，請多多利用本院