




## 如何正確使用『陰道栓劑』『陰道乳霜劑』

### ◇ 『陰道栓劑』的使用方式

1. 洗淨雙手。
2. 撕開栓劑外包裝（臘狀栓劑可用冷水浸潤1~2秒使之濕潤；藥片狀栓劑則不可）。
3. 採蹲姿或仰臥屈膝兩腿微張，將栓劑以手指慢慢推入陰道內2~4吋處（1~2指節深微微感到有阻力或不適處即可），使栓劑在體內慢慢融化。
4. 再次清洗雙手。

### ◇ 『陰道乳霜劑』的使用方式

1. 洗淨雙手。
2. 打開軟膏蓋子，將送藥器旋轉至軟管上。
3. 將送藥器鎖到底後，擠壓軟膏填充適量藥量至藥器中。
4. 將送藥器於軟膏上旋轉移除。
5. 採蹲姿或仰臥屈膝兩腿微張，將送藥器慢慢推入陰道內2~4吋處（1~2指節深），輕輕的壓送藥器使軟膏推送入陰道後，小心移出送藥器。
6. 用完送藥器後拆開以溫肥皂水清洗晾乾。
7. 蓋上蓋子，再次清洗雙手



### 注意事項

- 使用完陰道用製劑後，必要時可使用衛生棉，防止栓劑溶解時滲出。切勿立即進行外陰道沖洗。
- 用藥時間儘量避免性交，或請男士使用保險套。
- 藥品使用均須放入陰道深處，月經期間仍須繼續用藥，不可擅自停藥。
- 非醫師指示，懷孕及哺乳病患請勿使用。
- 陰道栓劑需保持硬度以方便使用，如果栓劑變形或軟化，而導致使用困難時，可按下列方法，等栓劑凝固後再使用。
  1. 栓劑變形：放於原塑膠包裝內，浸入溫水（約40~50°C）中，待軟化後再浸入冷水（20°C以下）即可凝固成形。
  2. 栓劑軟化：依原塑膠包裝型態，浸入冷水（20°C以下）即可凝固。

- 此單張不包含所有藥品資訊，如有任何疑問，請再詢問您的醫師或藥師。