

藥品衛教單張

學名 Indacaterol 110 μ g +Glycopyrronium 50 μ g

商品名 Ultibro 110/50 Breezhaler inh powder hard cap.

(昂帝博吸入膠囊)

藥物作用 慢性阻塞性肺疾 (COPD; 包括慢性支氣管炎及肺氣腫) 之維持治療。

降低有惡化病史病人之 COPD 惡化。

(一種藥可能會有不同的療效, 若您對病情有疑慮, 請諮詢您的醫師或藥師)

如何使用

建議劑量為一次一粒膠囊, 使用 Ultibro Breezhaler 吸入器每天吸一次。

Ultibro Breezhaler 建議在每日相同的時間使用。若錯過一次的劑量, 應儘速在同一天內用藥。應指導病人一天不可使用超過一個劑量。

請依照醫師指示用藥。若沒有醫師指示, 請不要自行更改或突然停止使用藥物。

當忘記使用一個劑量

若馬上想起來請盡速補用, 但若錯過的劑量已接近下一次用藥時間, 請直接使用下次之劑量即可。切勿同時或短時間內使用兩次劑量。

注意事項

1. 若您曾對本藥或任何賦形劑成分過敏, 請告知您的醫師。
2. 若您有使用任何其他藥物 (包括非處方藥, 維生素和草藥產品), 請事先告知您的醫師。
3. 使用本藥請穩定回診, 因您的醫生會於回診時檢查您的病情和藥物的作用。
4. 若您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳, 請事先告知您的醫師。
5. 本藥不可用來治療氣喘, 因缺乏此適應症的資料, 也不可用於治療急性發作。
6. 隅角性青光眼或尿滯留病人應小心使用。
7. 患有罕見遺傳性半乳糖不耐受症、乳糖不耐受症或葡萄糖-半乳糖吸收異常的病人不應使用本品。

可能副作用 (副作用發生因人而異), 用藥後若有不適情形或副作用持續、加重已造成您的困擾, 請回診告知醫師

上呼吸道感染、鼻咽炎、尿道感染、鼻竇炎、鼻炎、喉嚨刺激等。

儲存條件

膠囊應存放在鋁箔片中防潮, 使用前才取出, 僅可吸入使用, 膠囊不可吞服。每次新的處方均須附加一個 Onbrez Breezhaler 吸入器。吸入器使用 30 天後應丟棄。膠囊應存放在鋁箔片中防潮, 使用前才取出, 僅可吸入使用, 膠囊不可吞服。將藥物在室溫下存放在密閉容器中, 遠離熱源, 濕氣和直射光。將所有藥物放在兒童接觸不到的地方。切勿與任何人分享您的藥物。

本衛教單張並未包含所有的藥品資訊, 若您仍有其他相關問題,


請詢問您的醫師或藥師。

如何使用吸入器

如何使用吸入器




拔開帽蓋




打開吸入器：

握住吸入器的底座，以傾斜掰開口含器的方式，將吸入器打開。




準備膠囊：

沿著鋁箔片的分割線分開一個膠囊泡，撕開背面的保護膜，露出膠囊。不要將膠囊壓出鋁箔。



取出膠囊：


膠囊應存放在鋁箔片中，要使用前才取出。以乾燥的手將膠囊由鋁箔片中取出。不可吞服膠囊。



裝入膠囊：


將膠囊放入膠囊室中。

不可直接將膠囊放進口含器中。



蓋上吸入器：

蓋好吸入器，直到聽到‘喀’一聲。



刺破膠囊：

- 直立握住吸入器，口含器朝上。
- 同時緊壓兩邊的按鈕來刺破膠囊。只可按一次。
- 聽到‘喀’一聲表示膠囊已被刺破。