

胰妥讚注射劑/易週糖注射劑 使用方法

◎胰妥讚注射劑：(紅)胰妥讚注射劑 2mg/1.5ml、(藍)胰妥讚注射劑 4mg/3ml

- 起始劑量為每週一次皮下注射 0.25 mg，連續四週。
- 0.25 mg 劑量持續四週後，增加至每週一次 0.5 mg。
- 每週劑量 0.5 mg 至少四週後，如果需要加強血糖控制，可增加至每週一次 1 mg。最大建議劑量為每週一次 1 mg。

胰妥讚® 注射步驟

請參考胰妥讚® 注射筆所附的完整使用說明

- 1 檢查注射筆，並裝上新的針頭**

檢查胰妥讚® 注射筆中的溶液是不是透明無色。如果看起來混濁或變色，請勿使用注射筆。
裝上新的針頭後，取下針頭的內、外蓋。
- 2 檢查排空**

使用新的注射筆第一次注射前，請先檢查是否已排空。
轉動劑量設定鈕，直到劑量計數器顯示排空檢查符號 (● ■)。
按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0，針尖應該會看到一滴溶液。
- 3 設定劑量**

轉動劑量設定鈕，直到劑量計數器顯示至您的處方劑量 (0.25 mg、0.5 mg)。
如果選錯劑量，可以往前或往回轉動到正確的劑量。
⚠ 請勿計算「喀噠聲」次數。
劑量計數器的選定劑量必須準確對齊指示線，才能確保劑量正確。
- 4 進行注射**

將針尖刺入皮膚。
按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0，可能聽到「喀噠聲」。
針尖先不要拔出，然後慢慢數到 6，以確保劑量完整注入。
將針頭從皮膚拔出。
- 5 移除針頭**


從針頭前端套入針頭外蓋。
蓋緊針頭外蓋。
旋轉取下針頭，將針頭移除並丟棄。
將筆蓋套回注射筆。

胰妥讚® 注射部位

最適合注射胰妥讚® 的部位為大腿、腹部或上臂

● 如何使用Trulicity®(易週糖®)

- 注射筆請存放在冰箱。
- 如果無法冷藏，注射筆在室溫下(<30°C)可放置14天。
- 注射筆包含玻璃的部分，如果掉落，請換一支新的注射筆。
- 藥物可以注射在腹部或大腿，或由別人協助注射在您上臂後側。
- 可以每週注射在身體相同部位，但不要剛好注射在同一個點上。
- 醫護專業人員會協助您選擇最適合的注射部位。




注射部位

如果錯過一劑該怎麼辦？

- 如果距離下次用藥時間還有3天(72小時)以上，請立即注射。
- 如果距離下次用時間不到3天，請跳過這一劑。
- 兩劑Trulicity®(易週糖®)之間至少要隔3整天以上。

：使用Trulicity®(易週糖®)簡單方便




1. 打開蓋子

請確認注射筆已上鎖。

- 拉開灰色蓋子，把蓋子丟掉。


灰色蓋子不可以蓋回注射筆，以免損壞針頭。不要碰觸針頭。



2. 放置並解鎖

- 將透明底座平貼緊壓乾淨皮膚。然後，轉動鎖定環解鎖。

注射筆一定要緊壓皮膚，再解鎖。如果太早按下注射按鈕，可能浪費掉一劑藥物。




3. 按住不放

- 按住綠色按鈕不放；會聽到清楚卡嗒聲。

- ▲ 繼續將注射筆緊壓皮膚，直到聽到第二聲卡嗒聲。
- 可能需要5到10秒鐘。

將注射筆拿開。



看到標籤下方，注射筆內的灰色部分時，就表示藥物已經注射完畢。



易週糖®注射筆操作影片。如果有疑問，請詢問醫護專業人員。

EV-MKT-DG-058-19-Dec-10

適用於已處方Trulicity®(易週糖®)控制第二型糖尿病的患者