


如何正確使用『陰道栓劑』『陰道乳膏劑』『陰道用凝膠』

一、『陰道栓劑』的使用方式

1. 洗淨雙手。
2. 撕開栓劑外包裝（臘狀栓劑可用冷水浸潤1~2秒使之濕潤；藥片狀栓劑則不可）。
3. 採蹲姿或仰臥屈膝兩腿微張，將栓劑以手指慢慢推入陰道內2~4吋處（1~2指節深微微感到有阻力或不適處即可），使栓劑在體內慢慢融化。
4. 再次清洗雙手。

二、『陰道乳膏劑』的使用方式


1. 洗淨雙手。
2. 打開軟膏蓋子，將送藥器旋轉至軟管上。
3. 將送藥器鎖到底後，擠壓軟膏填充適量藥量至藥器中。
4. 將送藥器於軟膏上旋轉移除。
5. 採蹲姿或仰臥屈膝兩腿微張，將送藥器慢慢推入陰道內2~4吋處（1~2指節深），輕輕的壓送藥器使軟膏推送入陰道後，小心移出送藥器。
6. 用完送藥器後拆開以溫肥皂水清洗晾乾。
7. 蓋上蓋子，再次清洗雙手



三、『陰道用凝膠』素女潔陰道用凝膠

請依照醫師指示用藥。建議劑量為一次5gm，一天一次或兩次塗於陰道內，連續5天，若一天一次使用者，應於就寢時使用。

施藥器使用方法：



1. 施藥器之充填

*取鋁管外蓋的尖端刺破鋁管封口(圖一)。

*將施藥器旋上鋁管口(圖二)。

*拉開施藥器之壓縮管，再將凝膠輕擠入施藥器內，直至施藥器全滿為止。(圖三)。

2. 施藥器之使用

*採舒適坐姿或仰臥，握住施藥器外管輕塞入陰道深處。

*輕推壓縮管導入凝膠至使用完畢後取出(圖四)。

3. 施藥器之清理

*取出施藥器後繼續推擠壓縮管至與外管分離(圖五)。

*分別以溫水清洗後，再次安裝以便使用。