

➤AVAMYS 艾敏釋鼻用噴液懸浮劑

注意事項



使用前用力搖勻鼻噴劑



緊實地按壓按鈕一口氣到底，如果按鈕難以用拇指按壓，您可以改用食指、中指和無名指同時按壓



每次用完後請擦式噴嘴和蓋子裡面



請勿在噴嘴上使用針或尖銳物品清潔



用完後立即蓋回蓋子，以防染塵、保持瓶內的氣壓，並防止噴嘴堵塞

Avamys™
fluticasone furoate

操作方便

方便病患使用的噴霧式裝置

可見視窗看得見剩餘藥量



短噴頭患者使用更舒適

側邊壓按使用方便



噴出量是其他類固醇鼻噴劑的一半



不會流入喉嚨或流出鼻孔



無氣味，幾乎沒有殘留味

gsk GlaxoSmithKline

荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

台北市忠孝西路一段66號24樓 電話: 02-2381-8806 傳真: 02-23120812 網址: www.gsk.tw

衛署藥輸字第024877號 本藥品需要由醫師處方使用

TW/FF/0004/13-JAN2013

Avamys™
nasal spray suspension
27.5 micrograms/spray

病患使用說明

fluticasone furoate

120
sprays

本單張僅限由醫護人員
提供予使用本產品之病患衛教使用

如何預備艾敏釋



以下情況您必須進行準備鼻噴劑程序：

- 首次使用噴霧劑前
- 蓋子曾經沒有蓋回

鼻噴劑的準備程序能確保您每次都能得到完整的藥物劑量。請依下列步驟進行：

1. 蓋回蓋子，並將鼻噴劑用力搖勻大約十秒鐘。



2. 用拇指和食指輕輕夾著蓋子兩邊，直立取下蓋子



3. 垂直拿著鼻噴劑，並把噴嘴向外

4. 緊實地按壓按鈕一口氣到底，並重覆至少 6 次直到空中出現一團微細的噴霧



現在您可以隨時使用您的鼻噴劑

如何使用艾敏釋



1. 用力搖勻鼻噴劑



2. 取下蓋子

3. 擤清鼻孔，然後頭稍微向前傾

4. 垂直拿著鼻噴劑，將噴嘴小心地放進其中一邊鼻孔



5. 將噴嘴末端稍微向外，離開鼻中隔。這有助藥物達到鼻孔內正確部位



6. 用鼻吸氣時，請緊實地按壓按鈕一口氣到底

7. 小心不要讓藥物噴進眼睛。如果發生這種情況，請用清水沖洗眼睛



8. 移出噴嘴，並用口呼氣

9. 如果您的醫生告訴您，每邊鼻孔必須噴兩次的话，重覆步驟 4 至 6

10. 噴藥於另一邊鼻孔時，亦請重覆步驟 4 至 6

11. 把蓋子蓋回鼻噴劑

如何清潔艾敏釋



每次使用完畢：

• 請用乾淨的乾紙巾來擦拭噴嘴和蓋子內面。請勿用水來清潔



• 請勿使用別針或任何利器在噴嘴上

• 清潔完畢請立即蓋回蓋子，以防塵、保持瓶內的壓力，並防止噴嘴堵塞



如果鼻噴劑看似未能正常運作：

透過窗格內的液體水平檢查是否仍有剩餘藥物。如果水平太低，剩餘藥物可能不足以讓鼻噴劑正常運作

檢查鼻噴劑是否有損壞

如果您認為噴嘴可能被堵塞，請勿使用別針或任何利器來清潔

嘗試依「如何準備鼻噴劑」的指示來重新備妥鼻噴劑

►Azetin Nasal Spray 噴立停鼻用噴液

天氣變化，不少人
一起床就連打好幾個噴
嚏、流鼻水、鼻塞，小心
這是過敏性鼻炎症狀。

過敏性鼻炎指的是因接觸過敏
原後引起的鼻黏膜發炎。會有打噴
嚏、鼻塞、流鼻水、鼻子癢等等症狀
表現。

非藥物治療：避免接觸過敏原。

藥物治療：可使用口服藥物及局部使用的
鼻噴藥物。

可長期使用的鼻噴藥物包含以下二類，皆
可提供安全有效的治療。

鼻噴藥物

- 抗組織胺
(Anti-Histamine)
- 類固醇
(Steroid)



專業網站衛教資訊
鼻科醫學會
鼻炎衛教影片

鼻噴劑 使用注意事項



使用後15分鐘內，
請勿擤鼻子

千萬不可用尖銳物
品將噴嘴口弄大，
破壞噴霧器裝置



若噴頭阻塞時，可依下列方式清潔噴嘴：


- 1 將噴頭拆下
- 2 噴頭朝下，以溫水沖洗
- 3 將水甩乾並風乾
- 4 再將噴頭裝上
- 5 重新對空噴壓藥劑直至細微噴霧狀產生
且使用正常為止




鼻噴劑 病患使用說明

 synmosa

病患使用說明 Instructions



- 搖動藥瓶5-10秒。



- 將安全環取出，並取下保護蓋。



- 輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
- 頭稍微向前傾。




• 低頭，往下看

- 將噴頭小心的置入一側的鼻孔中。
- 用手指壓住另一側的鼻孔。
- 避開鼻中隔，朝向後鼻腔，用指力壓下噴頭同時緩緩吸氣，然後自嘴巴慢慢呼氣。

病患使用說明 Instructions



- 在另一側的鼻孔重覆相同步驟。
- 若需各噴兩下，則再重複4-6步驟。



- 使用完畢，將噴頭輕拭乾淨。
- 蓋回保護蓋和安全環。
- 保持藥瓶正放，妥善保存。

- 使用時，先充分搖動藥瓶，取下安全環和保護蓋，以拇指支撐瓶底，食指和中指夾住白色瓶頸之環座。
- 第一次使用請先對空噴壓藥劑約10次，直至出現微細均勻噴霧狀，代表本藥可使用。
- 若超過72小時未使用，請再次重複上述步驟，唯只需對空噴壓1次。
- 每次使用請依照上述步驟。



鼻噴劑 種類



目前使用藥品	☐	☐	☐	☐	☐
使用時間	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

鼻噴藥物主要的吸收部位為鼻腔黏膜，所以藥物在噴出後要能行成一大範圍角度的噴霧狀，才可均勻散佈在鼻腔內，讓鼻黏膜吸收。
鼻噴劑的使用可增加藥物治療效果，減少產生全身性的副作用。



➤Nasonex nasal spray 內舒拿水溶性鼻用噴液劑

使用說明

為達到最大的藥效及最低的併發症風險，必須正確使用 Nasonex。為使病人有最好的用藥順應性，在開始治療前應再次強調 Nasonex 的用法及用量。使用方法如下：

使用前充分搖動 Nasonex 藥瓶，並仔細閱讀使用方法，按照指引用藥。



(圖A)



(圖B)



(圖C)

1. 拔開防塵蓋(圖 A)。
2. 第一次使用時，以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部往下壓，以將幫浦引流(圖 B)。壓—放幫浦約 6~7 次，直到均勻的噴霧產生。此時噴霧幫浦已可使用。如果已有 14 天或更久未曾使用，下次使用前應重新引流。
3. 使用前應充分振搖容器。
4. 輕輕擤出鼻涕以清潔鼻孔。壓住一邊鼻孔。頭部向前微傾，持瓶身向上，小心將噴頭伸進鼻孔(圖 C)。
5. 以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部充分一次壓到底是一個噴劑量，噴完後自此鼻孔輕輕吸氣。
6. 另一邊鼻孔重複上述動作。
7. 將防塵蓋蓋回。



請勿穿刺噴頭

清潔噴頭時，拔下防塵蓋，輕輕自白色頸部將噴頭拔起，與防塵蓋一起用冷水沖洗。待乾後將其裝回原位。