


檢驗項目	Blood culture			版本 2025.10.01
中文名稱	血液培養			
英文名稱	Blood culture			
適應症	提供臨床菌血症的診斷和使用抗生素的參考			
檢體類別	血液 (blood) 骨髓液 (bone marrow) 周邊血幹細胞 攜帶式腹膜透析液 (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD)			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	陰性 (No growth for 5 days)			
採檢容器和檢體量	 <p>檢體量：成人：10 -20ml、小孩：4-8ml 請採取足夠的檢體量，檢體量不足將會影響陽性率及延長陽性偵測時間</p>			
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 儘量在使用抗生素之前收集檢體。 在收集血液之前要先進行的準備工作，包括清潔抽血部位、血液培養瓶的塞子。 將抽血部位以 70% isopropyl 或 ethyl alcohol 清潔。將棉花棒沾取 1 到 2% 的 iodine 或是 10% 的 povidone-iodine，在抽血部位以同心圓的方式由內往外擦拭。等待抽血部位乾燥後，以針筒收集血液。 <ul style="list-style-type: none"> 飲食限制：無 用藥限制：無 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 12：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法：室溫，不超過 24 小時 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室 			
健保代碼與給付點數	健保碼	13016B	點數	380 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> 方法：BacT/ALERT 血液培養機自動監測 / VITEK MS 鑑定系統 			

- 干擾因素：無